

# 誤飲

| 飲んだ物         |                             | 対応          |   |
|--------------|-----------------------------|-------------|---|
| 食品保存剤        | 脱酸素剤                        |             | 緑 |
| シリカゲル        | 乾燥剤                         |             | 緑 |
| 生石灰          | 乾燥剤(海苔などの)                  | 吐かせない       | 黄 |
| 化粧水          | エタノール含有                     | 顔が赤くなったら受診  | 緑 |
| クリーム         | 油成分が多い                      |             | 緑 |
| 口紅           |                             |             | 緑 |
| 香水           | エタノール含有                     | 5ml以上飲んだら受診 | 緑 |
| マニキュア液及び除光液  | 毒性が強い                       | 吐かせない       | 黄 |
| シャンプー        |                             |             | 緑 |
| 石けん          |                             |             | 緑 |
| シャボン玉液       |                             |             | 緑 |
| 合成洗剤、洗淨剤     | 酸性、アルカリ性                    | 吐かせない       | 赤 |
|              | 中性、弱アルカリ性                   |             | 黄 |
| 漂白剤          | 塩素系                         | 吐かせない       | 赤 |
|              | 酸素系                         |             | 緑 |
| 除草剤          | パラコートも含む                    |             | 赤 |
| 蚊取り線香、マット    |                             |             | 緑 |
| 液体蚊取り        | 石油系溶剤                       | 吐かせない       | 黄 |
| ホウ酸団子        | ゴキブリ取り                      | 吐かせてから受診    | 黄 |
| 防虫剤          | パラジクロルベンゼン                  |             | 緑 |
|              | ナフタリン                       |             | 赤 |
|              | しょうのう                       | 吐かせない       | 赤 |
| 有機リン系殺虫剤     |                             |             | 赤 |
| マッチ          | 塩素酸カリ含有                     | 15本以上なめたら受診 | 緑 |
| ボタン電池        |                             |             | 黄 |
| 肥料、植物活力剤     |                             |             | 緑 |
| 芳香剤          | 液体、スプレー                     | アルコール類に注意   | 緑 |
|              | ゲル、粒                        |             | 緑 |
| 灯油、ベンジン、ガソリン |                             | 吐かせない       | 黄 |
| 大量の医薬品       |                             |             | 赤 |
| 灰皿の水         | ニコチン <sup>しんじけつえき</sup> 滲出液 |             | 赤 |



日中に  
かかりつけ医へ



夜間でも  
相談または受診



救急車を呼ぶ

## 誤飲したとき

誤飲したものによって対処方法が異なります。吐かせてはいけない物、すぐに救急車で受診しなくてはならないものがありますので、左のページの表で確認してください。表に記載がないものに関しては、下記の中毒情報センターに問い合わせをすることができます。誤飲したときは、誤飲した物や同じ物があれば必ず病院に持参するようにしてください。

## たばこの誤飲

乳幼児ではたばこ1本に含まれるニコチンが致死量です。乾いたたばこでは、含まれているニコチンの全量が吸収されることはあまりないのですが、水に浸っていたたばこはその液にニコチンが溶け出していて、吸収されやすく、少量でも非常に危険になります。ジュースやビールの空き缶を灰皿代わりに使うのはやめましょう。乾いたたばこを少量(2cm未満)食べた時や食べた量の大部分を吐いた場合は、そのまま数時間、顔色や嘔気など異常がないか、注意して様子を見ます。4時間以上たっても異常がなければまず安心できます。

## (公財) 日本中毒情報センター

化学物質(たばこ・家庭用品等)・医薬品・動植物の毒などによる急性の中毒に対する応急手当や、受診の必要性について、実際に事故が発生している場合のみ薬剤師が相談を受け付けています。

※異物誤飲(小石・ビー玉など)・食中毒・慢性の中毒・常用量での医薬品の副作用については、相談を受け付けていません。

### 一般市民専用電話「中毒110番」

- 大阪 ☎ 072-727-2499 (毎日・24時間対応)
- つくば ☎ 029-852-9999 (毎日・午前9時～午後9時)

### たばこ専用電話

☎ 072-726-9922 (毎日・24時間、テープによる情報提供)

いずれも情報提供料は無料です

救急車を呼ぶとき  
発熱  
けいれん  
下痢  
腹痛  
嘔吐  
咳  
喘息  
息苦しい  
泣きやまない  
発疹  
異常な耳  
鼻の腫れ  
口の異常  
頭をぶつけた  
やけど  
目をぶつけた  
お腹をぶつけた  
切り傷  
すり傷  
誤飲  
心臓蘇生  
AED  
子どもの事故予防  
上手に医者に  
かかる  
小児救急  
の情報