

コメント

【今週の傾向】


A群溶血性連鎖球菌は西部、中央・北部、東南部での報告が多く見られます。年末年始を経て再び増加し始めました。

感染性胃腸炎は中央・北部での発生が目立ちます。年末年始を経て再び増加し始めました。

水痘は減少傾向です。

外出後は手洗いうがいに心がけましょう。

病気の説明・予防方法には感染症情報たより「インフルエンザの流行前に」へ



	2005年 第49週	2005年 第50週	2005年 第51週	2005年 第52週	2006年 第1週	2006年 第2週	地域別			みなみ 野
							中央・ 北部	西部	東南部	
咽頭結膜熱	2↓	3↑	4↑	2↓	2→	0↓	0	C	0	0
A群溶血性連鎖球菌	66↓	82↑	85↑	31↓	18↓	39↑	7	12	15	5
感染性胃腸炎	259↑	373↑	356↓	266↓	144↓	225↑	77	40	95	13
水痘	62↓	99↑	77↓	42↓	58↑	48↓	8	14	11	15
手足口病	7↑	3↓	3→	0↓	4↑	2↓	1	1	0	0
伝染性紅斑	8↑	6↓	7↑	1↓	2↑	10↑	3	1	6	0
突発性発疹	14↓	15↑	14↓	9↓	7↓	11↑	3	5	1	2
百日咳	2↑	0↓	0→	0→	0→	1↑	1	C	0	0
風疹	0↓	0→	0→	0→	0→	0→	0	C	0	0
ヘルパンギーナ	0→	0→	0→	0→	0→	1↑	0	1	0	0
麻疹	0→	0→	0→	0→	0→	0→	0	C	0	0
流行性耳下腺炎	18↓	37↑	29↓	11↓	23↑	22↓	6	3	11	2
インフルエンザ	29↑	72↑	93↑	73↓	41↓	132↑	34	29	52	17
マイコプラズマ肺炎	5↑	9↑	4↓	5↑	6↑	3↓	1	C	1	1
その他	5↑	2↓	0↓	0→	1↑	1→	0	C	1	0

### 年齢別発生状況(2週)

	咽頭結膜熱	A群溶血性連鎖球菌	炎症感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ギーナヘルパン	麻疹	流行性耳下腺炎	インフルエンザ	マイコプラズマ肺炎	その他
～6ヶ月	0	0	4	1	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0
～12ヶ月	0	0	16	4	0	0	6	0	0	0	0	0	4	0	1
1歳	0	0	37	14	0	1	2	0	0	0	0	1	16	1	0
2歳	0	4	23	8	1	0	0	0	0	1	0	3	15	0	0
3歳	0	5	18	7	1	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0
4歳	0	3	11	3	0	0	0	0	0	0	0	2	22	0	0
5歳	0	8	15	4	0	5	0	0	0	0	0	4	15	1	0
6歳	0	6	13	3	0	3	0	0	0	0	0	3	12	0	0
7歳	0	3	8	3	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0
8歳	0	2	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0
9歳	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
10～14歳	0	5	30	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	0	0
10～12歳													3		
13～14歳													1		
15～19歳	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20歳以上	0	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0
合計	0	39	225	48	2	10	11	1	0	1	0	22	132	3	1

#### 地区ブロックの分け方

中央・北部：本庁、石川事務所、加住事務所、北野事務所管内

西部：元八王子事務所、川口事務所、恩方事務所、浅川事務所、横山事務所、館事務所管内

東南部：由井事務所（みなみ野を除く）、由木東事務所、南大沢事務所管内