

二種混合(DT)予防接種のお知らせ



1 対象者 11歳（11歳の誕生日の前日）～12歳11か月（13歳の誕生日の前日）までの方

八王子市に住民登録がない状態で接種を受けると、**全額自己負担**となります。
なお、転出届の提出日ではなく、転出日から住民登録がなくなりますのでご注意ください。

2 接種回数 1回

※この予防接種は、乳幼児期に接種した三種混合の2期接種に該当し、これらの接種で得られた基礎免疫を強化するためのものです。

なお、三種混合が完了していない場合は、保健所健康政策課へお問合せください。

3 接種スケジュール

無料で接種できる年齢	11歳～12歳11か月
推奨接種年齢	11歳～11歳11か月
接種回数	1回

4 予防する病気の特徴

① ジフテリア（Diphtheria）

ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などで、偽膜（のどの奥が白く見える）とよばれる膜ができ、呼吸困難や窒息を起こすことがあります。発病後、菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こすことがあります。

② 破傷風（Tetanus）

破傷風菌は人から人への感染はなく、土の中にいる破傷風菌が傷口から人の体内に入ることによって感染します。菌の出す毒素によって、最初は口が開かなくなるなどの症状で気づき、やがて全身のけいれんを起こすようになり、治療が遅れると死亡することがあります。患者の半数は、自分や周りの方でも気付かない程度の小さな傷が原因で発症しています。土中に菌がいるため、感染する機会は常にあります。

※ジフテリアと破傷風の二種混合予防接種は、英語表記の頭文字をとって、**DT**とも表現されます。

5 ワクチン接種の効果と副反応

【効果】

- ① ジフテリア：ジフテリアにかかるリスクを95%程度減らすことができると報告されています。
- ② 破傷風：100%近い方が十分な免疫を獲得すると報告されています。

【副反応】

局所反応として、注射した部位の赤み、痛み、腫れ、しこり、痛みがあります。数日で自然に治まることが多いです。しこりは、少しずつ小さくなりますが、数か月認められることもあります。全身反応としては、発熱があります。非常にまれですが、アナフィラキシー（※）などの重大な副反応があるといわれています。通常反応のほかに何らかの異常（けいれん・高熱など）が強く出た場合には、速やかに医師の診察を受け、保健所健康政策課へ連絡してください。

※アナフィラキシー：通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のこと。顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出る、息苦しい、嘔吐などの症状やショック状態になるような、激しい全身反応のこと。

6 健康被害救済制度

定期予防接種を受けて重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法の規定に基づき、健康被害に対する給付が行われます。

【お問合せ先】

八王子市保健所 健康政策課 〒192-0083 八王子市旭町 13-18 ☎ 645-5102/FAX 644-9100