

# ヒブ(Hib)感染症予防接種のお知らせ



## 1 対象者 2か月（2か月になる日の前日）～4歳11か月（5歳の誕生日の前日）

八王子市に住民登録がない状態で接種を受けると、**全額自己負担**となります。  
 なお、転出届の提出日ではなく、転出日から住民登録がなくなりますのでご注意ください。

## 2 接種回数

接種開始時の年齢	1	接種回数			無料で接種できる年齢
2～6か月 (推奨接種)	初回	3回	4回	2	2か月～4歳11か月
	追加	1回			
7～11か月	初回	2回	3回	2	
	追加	1回			
1歳～4歳11か月	1回				

1 接種開始時の年齢により接種回数が異なります。

2 初回2・3回目の接種年齢により接種回数が異なります。

## 3 接種スケジュール

接種開始時の年齢が2か月（2か月になる日の前日）～6か月（7か月になる日の前日）

推奨接種	接種回数	初回	中27日	初回	中27日	初回	7か月	追加
4回接種 (初回3回 +追加1回)	・間隔	1回目	以上	2回目	以上	3回目	以上	追加

初回3回目接種が1歳を超えた場合	接種回数	初回	中27日	初回	中27日	追加
3回接種（初回2回+追加1回）	・間隔	1回目	以上	2回目	以上	追加

初回2回目接種が1歳を超えた場合	接種回数	初回	中27日	追加
2回接種（初回1回+追加1回）	・間隔	1回目	以上	追加

接種開始時の年齢が7か月（7か月になる日の**当日**）～11か月（1歳の誕生日の前日）

3回接種 (初回2回+追加1回)	接種回数 ・間隔	初回 1回目	中27日 以上	初回 2回目	7か月 以上	追加
初回2回目接種が1歳を超えた場合 2回接種(初回1回+追加1回)	接種回数 ・間隔	初回 1回目	中27日 以上	追加		

接種開始時の年齢が1歳（1歳の誕生日の**当日**）～4歳11か月（5歳の誕生日の前日）

1回接種

## 4 予防する病気の特徴

インフルエンザ菌b型という細菌によって起こる感染症です。冬に流行するインフルエンザのウイルスと名前が似ていますが、異なるものです。飛沫感染により感染し、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などのほか、髄膜炎、敗血症、肺炎などの重篤な感染症を起こすことがあります。ヒブ(Hib)による髄膜炎は、2010年以前では5歳未満で年間400人が発症し、約11%が予後不良と推定され、生後4か月から1歳までの乳児が過半数を占めていました。

## 5 ワクチン接種の効果と副反応

### 【効果】

ヒブ感染症を予防することにくわえ、重症化をほぼ100%予防できます。

### 【副反応】

局所反応として、注射した部位の赤み、腫れ、しこり、痛みがあります。全身反応として、発熱や不機嫌、食欲が落ちたり、寝付きが悪かったりすることがあります。非常にまれですが、アナフィラキシー( )などの重大な副反応があるといわれています。通常の反応のほかに何らかの異常(けいれん・高熱など)が強く出た場合には、速やかに医師の診察を受け、保健所健康政策課へ連絡してください。

アナフィラキシー：通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のこと。顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出る、息苦しい、嘔吐などの症状やショック状態になるような、激しい全身反応のこと。

## 6 健康被害救済制度

定期予防接種を受けて重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法の規定に基づき、健康被害に対する給付が行われます。

### 【お問合せ先】

八王子市保健所 健康政策課 〒192-0083 八王子市旭町 13-18 645-5102/FAX 644-9100